

CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TOXINAS A Y B EN MATERIA FECAL

INDICACIONES:

- Proveerse de un envase estéril de boca ancha con tapa hermética (puede ser uno de urocultivo)
- Proveerse de un recipiente seco para recoger las deposiciones (chata, palangana, etc), lavado con agua y jabón.
- Proveerse de una cuchara de plástico desechable, nueva o desinfectada, para trasvasar materia fecal al frasco, nunca hisopos.

TOMA DE MUESTRA:

- Obtener materia fecal de cualquier deposición espontánea en el recipiente desinfectado, no en el inodoro.
- Inmediatamente recoger el equivalente a una cucharada de té en el envase estéril. Si se trata de heces líquidas la cantidad a tomar será no más de 1 cm del recipiente estéril.
- En caso de que el paciente utilice pañal, colocar el pañal al revés con el plástico para adentro, cubrir la salida de la uretra (por donde hace pis) con un trozo de algodón para no contaminar la muestra con orina, y una vez que defaque, pasar al envase estéril.

RECOMENDACIONES:

- Entregar la muestra al laboratorio preferentemente dentro de las 6 hs. de recogida o tan pronto como sea posible.
- Conservar en heladera hasta su entrega al laboratorio.